



SALUT A LA LLAR

Quan estem malalts, el que més desitgen és la tranquil·litat de casa. Us demanem que vetlleu perquè els infants puguin gaudir d'aquest dret quan no es troben bé.

Quan unx infant assisteix a l'escola amb símptomes de malaltia exposa als altres a un perill de contagi, i a més, si no es troba bé es més fàcil que pugui contagiar-se d'altres malalties ja que les seves defenses estan baixes.

Us demanen també que no porteu als infants a l'escola quan estan sota els efectes d'antitèrmics (Dalsy, apiretal...) ja que malgrat que els símptomes queden encoberts, els infants estan en un període de malaltia.

Des de la Llar:

Quan unx infant tingui febre, no es trobi bé o mostri símptomes de malaltia, s'avisarà ràpidament a la família per telèfon perquè el vingueu a buscar el més aviat possible.

NO s'acceptarà l'entrada de cap infant (a no ser que porti un informe del metge indicant que no hi ha perill de contagi i que la Llar pot demanar si creu oportú) que presenti:

- Febre amb una temperatura igual o superior a 37'5°C (podrà tornar quan l'infant NO tingui febre).
- Diarrea líquida (en cas de que s'iniciï a la Llar, us trucarem a partir de la 3a diarrea líquida i podrà tornar quan passin 24h de l'última diarrea).
- Vòmits (podrà tornar quan passin 24h de l'últim vòmit).
- Infeccions o nafres disseminades a la boca (estomatitis, seguir les instruccions d'xl Pediatra)
- Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si porta informe d'xl Pediatra amb el diagnòstic indicant que NO són contagioses).
- Conjuntivitis purulenta (seguir indicacions d'xl Pediatra, després del tractament)
- Muguet (seguir indicacions d'xl Pediatra).
- Parasitosis intestinal sense tractament (Cucs, lambides...podrà tornar quan en tingui).
- En cas de patir una malaltia infecto-contagiosa (varicel·la, tuberculosi, xarampió, escarlatina, tos ferina, galteres..., seguir recomanacions d'xl Pediatra).
- Polls i/o llémenes (pediculosi, podrà tornar quan l'infant estigui netx).
- Altres malalties infantils tot i que no siguin infeccioses o no tinguin manifestacions febrils sempre i qual comportin el malestar general de l'infant i impedeixi la participació en les activitats habituals de la Llar. Exemple: una fractura o esquinçament (l'infant no pot seguir el ritme habitual de la Llar).

Direcció La Tribu de Cris.